

MANAGEMENT OF HYDROCORTISONE REPLACEMENT (URDU)

ہائیڈروکورتیزون سے متبادل طریق علاج

خون کے دباؤ اور خون میں شکر کو متوازن رکھنے کے لئے بدن کو ہائیڈروکورتیزون کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زندگی کے لئے بہر حال ضروری ہے۔ اس کے کوئی نا موافق اثرات نہیں ہیں۔ جب بھی متبادل خوراک کی وہ مقدار جس کی بدن کو ضرورت ہے لی جائے۔

روزانہ کے معمول کی متبادل خوراک

آپ کے بچے کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا گیا ہے \_\_\_\_\_ اور اسے ذیل کے مطابق لینا چاہئے۔

صبح \_\_\_\_\_ دوپہر \_\_\_\_\_ شام \_\_\_\_\_  
اگر خوراک لینا بھول جائیں، تو جتنی جلد ممکن ہو سکے خوراک لے لیں۔ اگر پورے دن کی خوراک لینا بھول گئے ہوں، تو صرف دو خوراکیں جتنی جلد ممکن ہو سکے لے لیں اور معمول کے مطابق کاربند ہو جائیں۔

اعصابی خلل کی خوراک (بیماری کی خوراک)

جسمانی دباؤ کے وقت، جیسے کہ ذیل میں ہیں، آپ کے بدن کو بہت زیادہ تعداد میں ہائیڈروکورتیزون کی ضرورت ہوتی ہے۔

- 101°F یا 38.5°C سے زائد بخار
- بیماری جیسے کہ جی متلانا، گلے یا کان کا انفیکشن
- درمیانے درجے کی جسمانی چوٹ جیسے کہ ایک زخم جسے ٹانگے درکار ہوں یا ہڈی ٹوٹنا۔

جو بھی بیماری یا زخم کی شناخت ہو جائے تو عمومی خوراک کی مقدار اس حد تک بڑھا دیں۔

اگر یہ اعصابی خلل والی خوراک ایک ہفتے سے زائد کے لئے دی جائے تو ڈاکٹر سے اس طریق کار پر بات کریں کہ خوراک کو معمول کے مطابق، کیسے واپس لانا ہے۔

شیر خوار بچوں کے لئے خصوصی ہدایات: جب ایک بچہ بیمار ہو تو معمول سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئے:

- رات کے دوران بچے کا بخار دیکھیں اور اس کا علاج اس طرح کریں جیسے آپ کے ڈاکٹر نے ہدایت کی ہو۔
- اس بات کا یقین کریں کہ بچے کو سیال اشیاء (فلوئڈز) کی کافی تعداد مل رہی ہے۔ پیڈیالیٹ Pedialyte® ایک چائے کے چمچ کے برابر شکر، یا فارمولا میں ملا کر دیں۔
- ایک بچہ جو عام طور پر جواب نہیں دیتا تو ڈاکٹر کو اسے دیکھنا چاہئے۔

ایسی بیماریوں کے لئے جن میں قے اور ریا اسہال، گرمی چوٹ (ہڈی کا ٹوٹنا)، ہوش کھو دینا،

عمومی بے ہوشی، یا بڑے مرگی کے دورہ میں انجیکشن کے ذریعہ ایمرجنسی میں ہائیڈروکورتیزون دینا

ہائیڈروکورتیزون انجیکشن کے لئے (100 mg / 2 mL) \_\_\_\_\_ mg جو کہ

\_\_\_\_\_ mL (or cc) مقدار میں ہے۔

انجیکشن کا اثر فوری ہوگا لیکن زیادہ دیر پا نہیں ہوگا۔ تقریباً 6 گھنٹے۔ 6 گھنٹے کے بعد بچے کو مزید ہائیڈروکورتیزون کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر بچہ گولیاں نہیں کھا سکتا تو انجیکشن ضرور دہرایا جائے۔

اضافی ہدایات:

اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اور اسے انجیکشن والے ہائیڈروکورتیزون کی ضرورت ہے تو اسے مزید طبی توجہ کی ضرورت پڑنے کا امکان ہے۔ اپنے بچے کو مزید جائزے اور علاج کے لئے فوراً مقامی ہسپتال لے کر جائیں۔

ضرورت پڑنے پر، اینڈوکرائینولوجی اینڈ ڈائیا بیٹس یونٹ (Endocrinology & Diabetes Unit) سے بی۔ سی کے چلڈرن ہسپتال میں رابطہ کریں۔ شام اور ویک اینڈ میں 24 گھنٹے ہیلپ لائن سروس کو اس نمبر 604-875-2161 پر کال کریں اور پیڈیاٹرک اینڈوکرائینولوجسٹ۔ آن۔ کال (Pediatric Endocrinologist-on-call) کے بارے میں دریافت کریں۔

بے ہوشی یا کسی دوسرے شدید طبی بحران کی صورت میں فوری طور پر انجیکشن دیں اور مدد کے لئے 911 کو کال کریں