

ENDOCRINOLOGY & DIABETES UNIT

Endocrine Clinic

Phone: 604-875-2117

Toll-free: 1-888-300-3088, x2117

Fax: 604-875-3231

<http://endodiab.bcchildrens.ca>



DATE: _____

MANAGEMENT OF HYDROCORTISONE REPLACEMENT (PUNJABI) ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ (ਆਮ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਮਾੜੇ ਅਸਰ (ਸਾਈਡ-ਇਫੈਕਟ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਮਲ (ਆਮ) ਮਾਤਰਾ **Normal Daily Replacement**

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ _____ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੇ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਵੇਰ _____ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ _____ ਸ਼ਾਮ _____

ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਇਕ ਦੁੱਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

ਸਟਰੈੱਸ ਡੋਜ਼ (ਬੀਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੋਜ਼) **Stress Dose (Illness Dose)**

ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

- 101 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਜਾਂ 38.5 ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਵੇਲੇ
- ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਸੰਘ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵੇਲੇ
- ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ

ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾ ਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

ਜੇ ਇਹ ਸਟਰੈੱਸ ਡੋਜ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ

ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

- ਬਾਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਿਓ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਲ (ਫਲੂਅਡ) ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਪੀਡਿਆਲਾਈਟ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚਾ ਖੰਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਲਾ ਕੇ ਦਿਓ
- ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਰੋੜਾਂ ਵੇਲੇ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ (ਕੋਈ ਅੰਗ ਟੁੱਟਣਾ) ਜਾਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ,

ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ (ਐਨਸਥੈਟਿਕ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੋਜ਼ (ਮਾਤਰਾ)

ਟੀਕੇ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ [100 ਮਿਲੀਗਰਾਮ (mg)/2 ਮਿਲੀਲੀਟਰ (mL)] _____ ਮਿਲੀਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ _____ ਮਿਲੀਲੀਟਰ (ਜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਹੈ

ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਰਤ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ-ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ; 6 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੇਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ: _____

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੀ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਕੋਰਟੀਸੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ, ਰੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੌਰਨ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਓ।

ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਸਮੇਂ, ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਪੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ **604-875-2161** ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨਾਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ **911** ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ